

**Мы можем вместе стать
супергероями и спасти
мир от эпидемии**



Сделайте прививку против COVID-19 и уменьшите риск заболеть

Подробнее:
covidspb.net



- 1** Дети тоже болеют коронавирусом и могут болеть достаточно тяжело с поражением лёгких до 75–85%, особенно имеющих сопутствующую патологию:
- ожирение;
 - заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и др.
- 2** Родителям детей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, необходимо, в первую очередь, думать о важности вакцинации против COVID-19 для сохранения здоровья ребёнка.

Вакцинация важна так же учащимся, которые проживают в общежитиях.

Подробнее:
covidspb.net

Вакцинация детей 12–17 лет против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя, вакциной «Спутник М», состоящей из двух компонентов доз, которые вводятся с интервалом в 21 день:

1 В прививочных пунктах детских поликлиник

2 По предъявлению документов:

- паспорт или свидетельство о рождении;
- СНИЛС;
- медицинский полис.

3 Необходимо заполнить согласие на вакцинацию и анкету о своем самочувствии и окружении:

- родителям/опекунами, если тебе не исполнилось 15 лет;
- самому, если исполнилось 15 лет.

Подробнее:

covidspb.net

4 Какая подготовка требуется перед вакцинацией?

Специальной подготовки не требуется. К вакцинации допускаются дети:

- заполнившие анкету пациента (заполняется родителями/опекунами, если ребенку нет 15 лет).
- не имеющие противопоказаний к вакцинации (родителям детей, имеющих хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим педиатром) прошедшие обязательный осмотр врача.

Какие побочные эффекты могут быть?

В рамках клинических исследований, выявлено, что реакции могут возникать в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней.

Могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:

1. **общие** – непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью;
2. **местные** – болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

Подробнее:

covidspb.net

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Какие взять документы на вакцинацию?

- Полис
- СНИЛС
- Паспорт или свидетельство о рождении

Подробнее:
covidspb.net